

L'attività di ricerca verte su numerosi trials clinici che utilizzano le nuove molecole in collaborazione con le società scientifiche nazionali (MITO, MANGO) ed internazionali (ESGO, EORTC) e con le unità operative sia cliniche che sperimentali. In questo modo vengono testate nuove molecole e nuovi modelli di trattamento.

SI CURA MEGLIO DOVE SI FA RICERCA.

Studi di Ricerca clinica aperti all'arruolamento della Struttura Complessa di Ginecologia Oncologica

ENDOMETRIO

Linfonodo sentinella nel carcinoma dell'endometrio: studio prospettico multicentrico sull'accuratezza diagnostica (prot. INT 05/05).

Valutazione dell'appropriatezza delle procedure di follow-up in Ginecologia Oncologica. Studio TOTEM: studio clinico multicentrico controllato randomizzato tra due regimi di follow-up a diversa intensità di esami nelle pazienti trattate per carcinoma dell'endometrio.

Valutazione preoperatoria dell'infiltrazione miometriale e del grading istologico nell'adenocarcinoma endometriale: studio prospettico multicentrico.

CERVICE UTERINA

Chemioterapia neoadiuvante con topotecan e cisplatino settimanali (topocis) nel trattamento del carcinoma spinocellulare della cervice uterina in stadio localmente avanzato: studio prospettico di fase 2 multicentrico non randomizzato (prot. INT 08/54).

Studio randomizzato di fase III che confronta chemioterapia concomitante e chemioterapia adiuvante con radioterapia pelvica esclusiva nel carcinoma endometriale ad alto rischio di fase avanzata (prot. INT 08/43).

VULVA

Studio di Fase II di chemioterapia neo-adiuvante con Taxolo-Ifosfamida-Platino in pazienti con carcinoma spinocellulare della vulva localmente avanzato.

OVAIO

Vaccinazione di pazienti affette da neoplasie localmente avanzate/ metastatiche della mammella e dell'ovaio con cellule dendritiche autologhe caricate con corpi apoptotici/necrotici di cellule tumorali autologhe precedentemente sottoposte a shock termico (prot. INT 04/06).

Studio dosimetrico e di localizzazione dell'anticorpo murino MOV18 marcato con 177LU nel carcinoma ovarico (prot. INT 06/20).

Studio randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, multicentrico sulla terapia di mantenimento con abagovomab in pazienti con carcinoma epiteliale ovarico dopo una risposta completa alla chemioterapia di prima linea (prot. INT 07/67).

MITO 7: Carboplatino + Paclitaxel ogni 3 settimane vs Carboplatino + Paclitaxel settimanale in pazienti con carcinoma ovarico: studio multicentrico randomizzato.

Doxorubicina liposomiale stealth vs Carboplatino + Paclitaxel in pazienti con recidiva di carcinoma ovarico tra sei e dodici mesi dal precedente trattamento con platino: studio multicentrico randomizzato – studio mito 8.

Studio clinico di fase I sulla somministrazione intraperitoneale di ONCOFID-P in pazienti con carcinomi peritoneali da tumore dell'ovaio, dello stomaco, della mammella, della vescica e del colon.