



ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DI MATERIALE PER ESAME CITOLOGICO DELL'ESPETTORATO

1. Espettorare al mattino a digiuno, dopo aver sciacquato la bocca con acqua, possibilmente gargarizzando. L'espettorato deve essere provocato da ripetuti e profondi colpi di tosse.
2. In soggetti con scarso espettorato si consiglia il trattamento con aerosol di mucolitici (Fluimucil, Bisolvon). In soggetti asintomatici si consiglia la raccolta di espettorato indotto mediante aerosol irritante.
3. L'escreato va raccolto in apposito recipiente contenente etanolo 50% (consegnato dalla Segreteria di Anatomia Patologica, orari 8.30-13.00 dal lunedì al venerdì).
4. La raccolta dell'espettorato deve essere ripetuta almeno 3 mattine consecutive.

N.B.: In ogni richiesta di esame devono essere segnalati:

- a) diagnosi clinica
- b) interventi precedenti
- c) eventuali terapie (attinoterapia, chemioterapia, ecc.) pregresse o in corso

Rev. N. 4 del 10.08.2021

E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo, compreso la fotocopia, non autorizzata dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori – Milano